

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

آبسه های دهان ، فک و صورت:

آبسه های دهان، فک و صورت معمولاً به علت پوسیدگی و آلودگی میکروبی پالپ دندان (مغز دندان) یا بیماری های لته ای ایجاد می شود.

با انتشار آلودگی از طریق ریشه دندان و شیار لته ای به داخل استخوان و سپس سوراخ شدن استخوان و توسعه به بافت های مجاور، علائم بروز می کند .

عفونت های دهان و دندان در موارد شدید می تواند به نواحی دور تر چون داخل جمجمه ، چشم ها ، گردن و قفسه سینه انتشار یافته و خطرات بالقوه ای چون مرگ و میر را همراه داشته باشد.

به همین دلیل مراجعه زود هنگام به پزشکان و متخصصان بیماری های فک و دهان ضروری است.

علائم آبسه های دهانی:

علامت های اولیه در آبسه های دهانی ، درد ناحیه فک به خصوص هنگام فشار روی دندان ها و معاینه آنها می باشد.

در ادامه تب ، بی حالی، لقی دندان ، تورم ، حساس و قرمز شدن روی لته ها و سپس پوست ، ترشح چرک داخل دهان و یا سوراخ های ایجاد شده روی پوست می باشد .

در صورت عدم درمان مناسب و درگیری فضاهای صورتی و گردنی بیمار دچار ناتوانی در باز کردن دهان ، دشواری در بلعیدن غذا و مایعات و در نهایت مشکلاتی در تنفس خواهد شد که نشان دهنده وخامت حال بیمار است .



پیشگیری:

- ❖ مراقبت و رعایت بهداشت دهان و دندان
- ❖ مراجعه منظم به دندان پزشک
- ❖ پرهیز از استعمال دخانیات



در صورت بروز علائم اولیه آبسه ها و عفونت دندانانی_فک، مراجعه سریع به دندان پزشک و متخصصین جراحی فک و صورت ضروری است.

بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- 130

شماره ویرایش: -


تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۶/۱۵



سازمان نظام پزشکی

آموزش به بیمار

آبسه دندان



بیمارستان فاکم الانبیا، کایباد

وامد آموزش به بیمار (تابستان ۱۴۰۱)

تهیه و تنظیم: ممیده امسان پور (رابط آموزش)

نکات مراقبت در منزل:

- ❖ برای کاهش درد می توانید از شربت استامینوفن و یا ایبوپروفن استفاده کنید.
- ❖ استفاده از آب نمک با آب گرم تا هر چه زودتر عفونت از لثه سرباز کند.
- ❖ کمپرس یخ و یا حوله گرم، روی صورت کودک می تواند باعث کاهش درد شود.



منبع:

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان

اداری بیمارستان. تلفن: 54523990 داخلی ۲۴۵

درمان آبسه:

درمان آبسه های دندانی - فک شامل: درمان های طبی و دارویی و نیز درمان های جراحی است.

اولین اقدام در درمان، حذف عامل ایجاد کننده آبسه، درمان ریشه دندان یا کشیدن دندان عفونی و دندان نیمه نهفته و درمان عفونت های لثه ای می باشد.

استفاده از دهان شویه، نخ دندان و مسواک زدن بعد از هر وعده غذایی و استفاده از آنتی بیوتیک (چرک خشک کن) طبق تجویز پزشک توصیه می شود.

