

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

پورپورای هنوخ شوئن لاین:

این بیماری یک بیماری التهابی عروق کوچک است که کودکان به ویژه سنین ۴ تا ۱۲ سال را مبتلا می کند. و عموماً بدون عارضه جدی بعد از ۲ تا ۴ هفته پایان می یابد.

اغلب بیماران سابقه عفونت اخیر به ویژه در دستگاه تنفسی، یا واکسیناسیون و یا تماس با مواد شیمیایی را دارند و به همین دلیل بسیاری از اوقات اشتباهاً تشخیص بیماری های عفونی و آلرژی داده می شود.



علل بیماری:

علت بیماری یک واکنش خودایمنی است که در عروق خونی کوچک در سراسر بدن رخ می دهد و باعث التهاب و گرفتاری مویرگ ها می شود.

علائم بیماری:

۱. مشکلات پوستی: ضایعات پوستی قرمز

رنگ به صورت کبودی که قابل لمس هستند، تورم اطراف مفصل و اندام ها

۲. درگیری مفصلی: التهاب و درد مفصل زانو

و مچ پا که بدون ایجاد عارضه خودبه خود بهبود می یابد.

۳. درگیری گوارش: درد شکم که ممکن

است با استفراغ همراه باشد، علائم احتمالی دیگر اسهال و دفع خون در مدفوع

۴. درگیری کلیوی: عموماً به صورت دفع

خون مخفی در ادرار که به وسیله آزمایش ادرار مشخص می شود.

۵. درگیری دستگاه تناسلی: در حدود نیمی

از پسران مبتلا درجات خفیف تا متوسطی از تورم، قرمزی و درد بیضه ها وجود دارد.

۶. درگیری سیستم عصبی: تعداد کمی از

بیماران ممکن است علائمی از سردرد، تورم ناحیه جمجمه و ندرتاً تشنج را داشته باشند.



علائم هشدار دهنده که حتماً نیاز به

بستری و درمان دارد:

درد شکمی مقاوم به درمان (داروهای خوراکی) استفراغ و عدم تحمل خوراکی، دفع خون در مدفوع، مدفوع سیاه و قیری، وجود خون آشکار در ادرار، تورم بیضه ها و تشنج از علائمی است که در صورت بروز نیاز به بستری، بررسی بیشتر و احتمالاً دریافت داروی تزریقی دارد.

بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- ۱۰۲

شماره ویرایش: -

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۳/۲۱



بیمارستان خاتم الانبیاء قم

آموزش به بیمار

پورپورای هئوف شوئن لاین



بیمارستان خاتم الانبیاء قایباد

واحد آموزش به بیمار (بهار ۴۰۱)

تهیه و تنظیم: حمیده احسان پور

(رابط آموزش اطفال)

درمان بیماری:

بیش از نیمی از بیماران بدون نیاز به درمان و یا با درمان خفیف و کوتاه مدت بهبود می یابند .

درمان علامتی شامل :

کنترل درد ،تأمین آب بدن ،رژیم غذایی نرم و کاهش فعالیت فیزیکی می باشد.

در موارد شدید تر ممکن است از داروهای ضد التهابی و یا سرکوب کننده سیستم ایمنی به مدت طولانی استفاده شود.



منبع:

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان.تلفن: 54523990 داخلی ۲۴۵

تشخیص بیماری:

تشخیص بیماری یه تشخیص بالینی است ولی آزمایشات خون ،ادرار، مدفوع ،سونوگرافی شکم و گاهی نمونه برداری از پوست برای تشخیص بیماری و یا عوارض آن کمک می کند.

سیر بیماری:

اغلب طول مدت بیماری در حدود ۲ تا ۴ هفته است.

کمتر از نیمی از کودکان حداقل یک عود مجدد بیماری را در عرض یک دوره ۱ تا ۲ ماهه خواهند داشت که نسبت به حمله اولیه بیماری خفیف تر و کوتاه تر است .

اغلب بیماران مبتلا با یا بدون درمان به طور کامل بهبود می یابند ولی ندرتا گرفتاری کلیه ممکن است به صورت مزمن باشد که نیازمند درمان دراز مدت می باشد.