


مادرگرمای قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری عدم نزول بیضه نوزاد شما و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل می باشد.

سوالات رایج مادر :

بیضه نزول نکرده در نوزادان :

در هفتمین هفته دوران جنینی، بیضه ها در داخل شکم و در نزدیکی کلیه ها تشکیل می شوند و سپس در سه ماهه سوم بارداری، از درون شکم وارد کانالی که در کشاله ران هر طرف قرار داده شده و به طرف کیسه بیضه حرکت میکنند و در هفته ۳۶ دوران داخل رحمی در کیسه بیضه مستقر می شوند عدم وقوع این اتفاق تا زمان تولد کریپتو کیدیسم یا پایین نیامدن بیضه (UDT) می نامند .



این عارضه در نوزادان نارس و در موارد تولد با وزن بسیار کم شایع می باشد در نوزادان نارس ۳۰ در صد و در نوزاد کامل به میزان ۳ در صد دیده می شود . که در اغلب موارد نیز تا سه ماهگی بیضه خودبه خود وارد کیسه می شود اگر تا ۶ ماهگی وارد کیسه نشود حتما باید درمان شود.

علت :

علت اصلی نامشخص است اما موارد ارثی و هورمونی ممکن است در بروز آن نقش داشته باشند.

علائم :

معمولا علامتی ندارد مهمترین علانت در این کودکان کیسه بیضه خالی است .گاهی به علت همراهی این بیماری با فتق یا هیدرو سل ، والدین متوجه برآمدگی در کشاله ران می شوند .در پاره ای از موارد به علت عدم نزول کافی و عدم ثابت بودن بیضه متناوبا چرخش بیضه اتفاق می افتد که دردناک است و باید سریعاً به پزشک مراجعه کرد.

تشخیص قطعی :

تشخیص قطعی از طریق معاینه پزشک می باشد در ۸۰ در صد موارد با معاینه قابل تشخیص است ولی در سایر موارد پزشک جهت تشخیص از سونوگرافی و MRI کمک بگیرد.

درمان :

در صورتی که بیضه ها تا ۶ ماهگی پایین نیاید ، درمان اصلی جراحی است در این عمل جراح بیضه را داخل کیسه وارد میکند و بخیه می زند سن مناسب برای عمل ۶ تا ۹ ماهگی است

عمل جراحی در اکثر موارد موفقیت آمیز است چنانچه والدین نکات آموزشی در رابطه با مراقبت بعد عمل را رعایت نماید مشکل خاصی وجود نخواهد داشت






آموزش به بیمار

عدم نزول بیضه

Baby



مجله اینترنتی باحال مک bahamag.ir

بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (پاییز ۱۴۰۱)

➤ در صورت مشاهده علایم عفونت ، باید سریعاً به پزشک مراجعه شود این علایم عبارتند از درد ، تورم ، قرمزی در محل عمل و بروز تب

➤ کودک از فعالیت شدید و استفاده از وسایل بازی که مجبور باشد با پاهای باز بایستد و بنشیند به مدت حداقل ۴ هفته پس از عمل خودداری کند این کار برای جلوگیری از جابه جایی بیضه ها از کیسه بیضه می باشد.

با آرزوی سلامتی برای فرزند دلبندتان



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۵۴۵۵ داخلی ۲۴۵

عوارض دراز مدت :

ناباروری: درمان به موقع باعث کاهش ناباروری می شود در موارد یک طرفه ، میزان ناباروری با سایر افراد تفاوتی ندارد ولی در موارد دوطرفه میزان باروری تا ۵۰ درصد کاهش می یابد

سرطان بیضه: در این افراد بیشتر است . بنابراین معاینات دوره ای توسط پزشک جهت تشخیص زودرس این عارضه انجام شود

آمادگی قبل از عمل:

آموزش به خانواده بیمار و توزیع این مطالب که با افزایش سن در بچه های مبتلا ، احتمال ناباروری (نازایی) افزایش می یابد.

پس این عمل باید انجام شود و بیضه به محل طبیعی خودشان بازگردانده شود زیرا بیضه نسبت به گرما خیلی حساس است و دما داخل شکم نسبت به دما کیسه بیضه بالاست باقی ماندن بیضه داخل شکم باعث خواهد شد سلول های بیضه آسیب ببینند و باعث عارضه ناباروری می شود

مراقبت های بعد عمل:

➤ با تمیز نگه داشتن محل جراحی از ادرار و مدفوع ، می توان تا حد زیادی از بروز عفونت پیشگیری کرد.