



### فرم آموزش به بیمار و خانواده در زمان ترخیص(مخصوص حاملگی پوچ)

پزشک معالج:	بخش: زنان	نام:	نام خانوادگی:
تاریخ پذیرش:	اتفاق: تخت:	تاریخ تولد:	نام پدر:

#### آموزش نحوه مصرف دارو بعد از ترخیص توسط پزشک

امضاء پزشک	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف	نام دارو	آموزش دارو
		شب	صبح	ظهر

#### آموزش نحوه مصرف دارو بعد از ترخیص توسط پرستار

امضاء پرستار	نحوه صحیح مصرف دارو	میزان و مدت زمان مصرف			نام دارو	آموزش دارو
		شب	ظهر	صبح		
	قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □					
	قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □					
	قبل از غذا □ بعد از غذا □ همراه غذا □ ناشتا □ موقع خواب □ با آب زیاد □					

محدودیت خاصی ندارید میتوانید مواد غذایی حاوی آهن مثل: گوشت، پسته خام، اسفناج و تخم مرغ و... و همچنین سبزیجات و میوه، کمپوت آناناس، گلابی، مایعات فراوان و غذای ملین مصرف کنید.

بعد از

	در صورت جراحی 7 الی 10 روز بعد از جراحی جهت چک کردن محل عمل به نزد پزشک خود مراجعه نمایید.	بعد از
--	--	--------

	در صورت داشتن تب و لرز، داشتن ترشحات چركی از محل عمل، رنگ پریدگی و سرگیجه و درد و خونریزی زیاد مراجعه فوری به پزشک داشته باشد	پس از تب و لرز
--	---	----------------

	از برداشتن اجسام سنگین و کار زیاد خودداری کنید. جواب نمونه پاتولوژی ارسال شده خود را دو هفته بعد، از واحد پاتولوژی بیمارستان پیگیری نمایید رابطه‌ی جنسی بعد از دفع و سقط حاملگی پوچ در صورت نداشتن خونریزی واژینال بلامانع است بهتر است تا 3ماه بعد از دفع و سقط حاملگی پوچ، اقدام به بارداری نکنید	بعد از دفع و سقط حاملگی پوچ
--	---	-----------------------------

	زمان مراجعه مجدد به پزشک: یک هفته تا ده روز پس از ترخیص و یا در صورت بروز هرگونه مشکل و علایم خطر سریعاً به مراکز درمانی مراجعه نمایید و یا در صورت داشتن سوال با شماره تلفن 54523990 206 داخلی 221 کلینیک آموزش سلامت تماس بگیرید.	میتواند
--	---	---------

امضاء و اثر انگشت بیمار یا همراه

مهر و امضاء پرستار:

مهر و امضاء پرستار: