




دانشگاه علوم پزشکی شهید

آموزش به بیمار

ختنه



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد
واحد آموزش

در صورت مشاهده موارد زیر باید با پزشک

خود تماس بگیرید:

خونریزی مداوم

افزایش قرمزی و یا عدم برطرف شدن آن ۳ تا ۵

روز پس از ختنه

تب

شدید ترشح و تورم، ترشح بدبو، تاول چرکی

ناتوانی در ادرار کردن در ۸-۶ ساعت اول پس از

ختنه

در صورتی که حلقه ختنه تا ۱۰-۱۲ روز پس از

عمل نیافتد کلاً آلت قرمز و متورم باشد

عدم پاسخ به مسکن و بی قراری شدید، گریه

شدید و امتناع از غذا خوردن

منبع:

www.nursingconsult.com



با آرزوی سلامتی برای

شما و کودک عزیزتان

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



© ختنه چیست؟ ختنه شایعترین عمل جراحی است که روی نوزادان پسر انجام می شود. در ختنه پوست کلاهیک آلت برداشته می شود. ختنه عموماً به دو روش حلقه و جراحی انجام می پذیرد.



مراقبت قبل از عمل

۶۰ از ساعت ۵ صبح روز عمل کودک باید ناشتا باشد.

۶۰ قبل از جراحی کودک را حمام کنید.

مراقبت پس از انجام ختنه

۶۰ در ۱۲ ساعت اول برای کاهش درد و بی قراری کودک از قطره استامینوفن به میزان ۲ برابر وزن کودک هر ۴ ساعت استفاده کنید. (حتماً در مورد مصرف این دارو از پزشک اجازه بگیرید)

۶۰ در ۱۲ ساعت اول از شستشوی محل ختنه پرهیز کنید و چنانچه کودک اجابت مزاج داشت با دستمال مرطوب یا پنبه محل آلوده را تمیز نمایید.

۶۰ بعد از ۱۲ ساعت شستن و حمام کردن کودک مانعی ندارد.

۶۰ بعد از ۱۲ ساعت شستن و حمام کردن کودک مانعی ندارد.

۶۰ روزی ۳ بار به مدت ۲ روز محل ختنه را با پماد تجویز شده توسط پزشک آغشته کنید.

۶۰ برای جلوگیری از فشار به محل ختنه، از پوشاندن شلوار و لباس تنگ به کودک تا زمان افتادن حلقه خودداری کنید و از پوشک با سایز بزرگتر استفاده کنید.

۶۰ در صورتی که از داروی دل درد برای کودکتان استفاده می کنید در شب اول طبق نظر پزشک آن را مصرف کنید و در صورت لزوم تکرار کنید.

۶۰ در همان ساعات اولیه تا ۳ مرتبه به کودک آب قند بدهید.

۶۰ حدود ۲۴ ساعت پس از ختنه در قسمت بعد از حلقه تورم و التهاب ایجاد می گردد که در صورت تورم شدید و غیر طبیعی به پزشک مراجعه کنید.

۶۰ حلقه تا روز دهم می افتد چنانچه با مشکلی مواجه شدید، مراجعه کنید.

۶۰ یک هفته پس از ترخیص جهت بررسی مجدد و معاینه به پزشک مراجعه کنید.

۶۰ در زمان جدا شدن حلقه ممکن است مختصری خونریزی اتفاق افتد که طبیعی است.

۶۰ تا ماهها بعد از ختنه بهتر است از پوشک و شلوار گشادتر استفاده کنید و محل مجرای ادراری را با وازلین چرب کنید.

