

مادرگرامی قدم نورسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری مسمومیت با مواد مخدر و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل و پیشگیری از مسمومیت نوزاد با مواد مخدر می باشد.

مسمومیت با مواد مخدر در نوزادان

چیست ؟

اگر نوزاد در منزل در اثر بازیگوشی یا بی توجهی و غفلت والدین مواد مخدر (شامل تریاک و متادون یا غیره) مصرف کند و باعث گیجی و خواب آلودگی نوزاد شود و در موارد شدید تر باعث قطع تنفس نوزاد شود مسمومیت رخ داده است

مادران معتاد که نوزاد آنها در منزل بی قرار می باشند حتما در صورت بی قراری شدید نوزاد به اورژانس بیمارستان مراجعه کنید و خودسرانه به نوزاد مواد ندهید که آرام شوند زیرا دچار مسمومیت می شوند .

علائم مسمومیت در نوزادان چگونه است

؟

بسته به نوع مواد مصرفی علائم متفاوت است اما در کل

۱ کاهش هوشیاری نوزاد

۲ کاهش تعداد تنفس و قطع تنفس نوزاد

۳ تشنج نوزاد

۴- اختلالات گوارشی مانند تهوع و استفراغ

۶ سفتی و تکانه های عضلانی

۵- خواب آلودگی نوزاد

۷- خوب شیر نخوردن نوزاد و بی حالی

اقدامات درمانی زمان مسمومیت ؟

عدم تغذیه نوزاد از طریق دهان زیرا احتمال دارد با استفراغ کودک مواد غذایی به ریه برگردد و نوزاد دچار خفگی شود .

برقراری راه وریدی و شروع مایعات وریدی

دادن اکسیژن با ماسک

جاگذاری لوله داخل معده از طریق بینی جهت شستشو معده نوزاد

تزریق دارو پادزهر مانند نالوکسان از طریق رگ جهت رفع علائم کاهش هوشیاری نوزاد

کنترل از نظر داشتن ادرار



چه موقع به نوزاد شیر دهید ؟؟

در صورت اجازه پزشک بعد از هوشیاری کامل میتوان به نوزاد شیر داد

در صورت داشتن استفراغ شیردهی را متوقف کنید و در صورت اجازه پزشک شیر دهید

بسمه تعالی

کد سند: ۹۱-CC-PAM

شماره ویرایش: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۱



آموزش به بیمار

مسمومیت با مواد مخدر



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (زمستان ۴۰۱)

توصیه به والدین برای محافظت از نوزادان خود در برابر مسمومیت با مواد مخدر:

- ۱- از نگهداری شربت متادون در شیشه های غیر دارویی نظیر بطری نوشابه و بدون برچسب دارویی خودداری کنید دارو را در دسترس قرار ندهید
- ۲- مادران معتاد با نظر پزشک با توجه به نوع ماده مصرفی شیر خود را به نوزاد دهند و در مورد شیر دهی نظر متخصص اطفال را بپرسند .
- ۳- در صورت ترخیص نوزاد نیاز به دارو با دستور پزشک داروها را مرتب در منزل استفاده کنید
- ۴- در صورت داشتن علائم ذکر شده مسمومیت اورژانس بیمارستان یا متخصص اطفال مراجعه نمایید .
- ۵ در صورت داشتن علائم بی قراری و اعتیاد نوزاد با مراجعه مرتب به متخصص اطفال نوزاد را ترک دهید
- ۶- غیر از شیر به نوزاد چیز دیگری مگر با نظر پزشک ندهید



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۵۲۳۹۹۰۵۴۵ داخلی ۲۴۵

مراقبت از این نوزادان:

- از دستکاری سرم ها و اتصالات کودک خودداری کنید
- دارو ها تجویز شده توسط پزشک مرتب به نوزاد توسط پرستار داده می شود .
- با تیم درمان همکاری لازم را انجام دهید
- ممکن است روزانه از کودک شما خونگیری شود
- از دادن خودسرانه دارو و بدون اجازه پزشک خودداری کنید
- کودک شما تا ۴۸ ساعت در بیمارستان بستری واز نظر تنفسی تحت نظر می باشد
- در صورت استفراغ و کاهش تعداد تنفس و یا کاهش هوشیاری نوزاد پرستار را آگاه کنید



داروی اپیوم (شربت تریاک)

عملکرد . نحوه مصرف . عوارض