

## مادرگرامی قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری انسداد دستگاه گوارش نوزادان و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل می باشد.


### سوالات رایج مادر :

#### بیماری انسداد روده چیست ؟؟

نوزادان به طور طبیعی باید تا ۳۶ ساعت اولیه مدفوع سیاه داشته باشند و اگر در این مدت دفع مکنونیوم انجام نشود، احتمال بروز انسداد روده بسیار زیاد است.

#### علایم دیگر انسداد روده نوزاد چیست ؟

اگر انسداد روده به مرور ادامه پیدا کند، علائم دیگری هم ظاهر می شود. عدم دفع گاز، استفراغ و بزرگ شدن غیرطبیعی شکم به صورت کاملاً مشخص از علائم انسداد روده هستند.



انسداد می تواند از دهان شروع شود و تا هر جای دسته گاه گوارش (مری، معده، روده بزرگ و روده کوچک) ادامه داشته باشد. به همین دلیل بسته به محل انسداد علائم متفاوت هستند مانند زمانی که نوزاد هرچقدر شیر می خورد، عمل دفع انجام نمی دهد و همین باعث بزرگ شدن و ورم شکم می شود. به دنبال این جریان، نوزاد به شدت گریه و بی قراری می کند، به هیچ وجه آرام نمی شود و استفراغ صفراوی (سبز رنگ) دارد.

انسداد روده به صورت مادرزادی در نوزادان بسیار شایع است مانند نوزادانی که با آنوس بسته (مقعد بسته) به دنیا می آیند. معمولاً پزشکان در معاینه های اولیه کودک به این موضوع پی می برند و مقعد نوزادان را معاینه می کنند اما مادران هم با مشاهده و کمی دقت می توانند به این مشکل فرزندشان پی ببرند. برای باز کردن مسیر مقعد، نوزاد باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد. علت دیگر انسداد روده در نوزادان، هیرشپرونگ است.

#### بیماری هیرشپرونگ



هیرشپرونگ یک اختلال عصبی - عملکردی در ناحیه شکمی است و طی آن همه ی قسمت های روده، بخشی از روده بزرگ و یا قسمت های ابتدایی دستگاه گوارش فاقد اعصاب هستند و در نتیجه در عملکردشان دچار مشکل می شوند. نوزادان به علت هیرشپرونگ هم دچار انسداد روده می شوند و هم بی قرار شده و استفراغ می کنند.

در صورتی که والدین نوزادشان را به موقع برای معاینه پیش پزشک نبرند، ممکن است روده پاره شود و همه ی میکروب های روده در محیط شکم (صفاق شکم) بریزند و موجب بروز عفونت شدید شوند که احتمال مرگ در این مورد زیاد است. همچنین ممکن است در اثر دیر مراجعه کردن، قسمت هایی از روده نکروزه (سیاه) شوند که باید در طول عمل جراحی این قسمت ها را از روده جدا کرد. در صورتی که هریک از این قسمت های روده می توانند به جذب ویتامین ها، چربی ها و مواد دیگر مربوط باشد بنابراین ممکن است آن نوزاد تا آخر عمر از جذب بسیاری از مواد محروم بماند.



بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- ۸۸


شماره ویرایش: -

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۳/۱۱



## آموزش به بیمار

### بیماری انسداد روده



© 2015 Healthline

بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (بهار ۴۰۱)

وقتی فرزندتان احساس خستگی می کند، اجازه دهید که کمی استراحت نماید.

### اگر فرزند شما تحت عمل جراحی قرار گرفت:

با توصیه ی پزشک معالج، حدود ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از جراحی می توانید زخم جراحی او را پانسمان کنید. منطقه ی برش داده شده حین جراحی را خشک کنید. تا زمانی که پزشک او صلاح نداند، حداقل تا ۲ هفته اجازه ی حمام کردن را به فرزندتان ندهید. روزانه منطقه جراحی شده را با آب گرم و صابون بشویید و آن را خشک کنید.

ممکن است کودک شما بعد از عمل اشتهای زیادی نداشته باشد. اما سعی کنید رژیم غذایی سالمی را برای او تدارک ببینید. پزشک متخصص در مورد غذاهایی که فرزند شما نباید بخورد به شما توضیحاتی خواهد داد.



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری  
بیمارستان تلفن: ۰۵۲۳۹۹۰۵۴۵ داخلی ۲۴۵

### درمان انسداد روده :

پدر و مادرها برای اینکه بتوانند این بیماری را در نوزادشان تشخیص دهند باید حواسشان به کار کردن شکم او باشد و در صورتی که متوجه شدند شکم بچه خوب کار نمی کند، باید حتما برای معاینه به متخصص مراجعه کنند. معمولا با استفاده از رادیولوژی شکم (عکس شکم) انسدادها در روده کاملا مشخص می شوند. بسیاری از انسدادهای روده تنها با عمل جراحی قابل درمان است مانند آنوس بسته (مقعد بسته). برای درمان انسداد فلجی روده نیز پزشکان می توانند آن را با اعمال ارتوپدی جابه جا کنند و در صورتی که به حالت عادی برگشت، آن را جراحی می کنند.»

### چگونه می توانید از فرزند خود در خانه مراقبت کنید؟

در ابتدا با مصرف داروهای تجویزی پزشک، وضعیت کودک را در حالت پایدار حفظ کنید. از فرزندتان بخواهید داروها (خصوصا آنتی بیوتیک تجویزی) را دقیقا طبق توصیه پزشک مصرف کند. اگر فکر می کنید فرزند شما با داروی خود مشکل دارد، با پزشک یا مرکز درمانی او تماس بگیرید.