

مادرگرمای قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری انسداد دستگاه گوارش نوزاد شما و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل می باشد.

سوالات رایج مادر :

بیماری آترزی مری چیست ؟؟

زمانیکه قسمتی از دستگاه ها ضمه به نام مری به خوبی تشکیل نشده است (مری قسمتی است که مواد غذایی را از دهان به معده منتقل می کند) و این بیماری به نقص مادرزادی است که قبل تولد اتفاق می افتد و انواع مختلفی دارد .

علائم آترزی مری نوزاد چیست ؟

1- کبود شدن پوست کودک حین تغذیه



2- سرفه و اوغ زدن حین تغذیه

3- خوب شیر نخوردن

4- آبریزش از دهان

روش های تشخیص بیماری :

1- قبل تولد با آزمایش و سونوگرافی میتوان این اختلال یا سایر اختلالات گوارشی را شناسایی کرد .

2- بعد تولد با مشاهده علایمی مانند سرفه و کبود شدن و خروج ترشحات فراوان از دهان این بیماری تشخیص داده می شود .

3- پز شک یا پرستار با عبور دادن سوند معده از بینی یا دهان نوزاد و عبور نکردن این سوند نتیجه قطعی میرسد.

4- عکس ساده شکم تجمع هوا در معده وروده نوزاد را نشان می دهد

درمان :

این بیماری یک اورژانس جراحی است بلافاصله بعد مساعد شدن وضعیت کودکان جراحی ترمیمی مری انجام می شود.

مراقبت قبل عمل :

1- عدم تغذیه نوزادان قبل از عمل

2- ترشحات جمع شده در حلق باید به طور متناوب با استفاده از پوار یا ساکشن خارج شود .

3- باید سرنوزادان به سمت بالا و به یک طرف نگهداشته شود تا ترشحات از دهان خارج شود .

4- در صورت تجمع ترشحات در دهان و بینی نوزادان و خروج کف از دهان و بینیش فوراً پرستار را مطلع کنید.


5- معمولاً داخل دهان یا بینی نوزاد لوله ای قرار میدهند مراقب باشید لوله خارج نشود در صورت خروج سریعاً به پرستار اطلاع دهید.





آموزش به بیمار

بیماری آترزی (عدم تشکیل) مری




بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (زمستان 400)

زمان مراجعه بعدی به پزشک :

- 1- تا 3 ماه اول هفته ای یکبار
- 2- تا س یکسال هر ماه یکبار
- 3- بعد یکسال هر 6 ماه تا سن 15 سالگی



با آرزوی سلامتی برای فرزند دلبندتان



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: 54523990 داخلی 245

مراقبت بعد از عمل :

- 1- بعد عمل جراحی نوزادان به مدت یک هفته در بخش مراقبت ویژه بستری می شود و 2 تا 3 روز به کمک دستگاه نفس می کشد .
- 2- بعد از عمل داخل دهان یا بینی نوزادان لوله ای قرار میدهند مراقب باشید لوله خارج نشود.
- 3- به مدت چند روز به کودکان از راه دهان شیر داده نمی شود و پس از این مدت ،عکس از نوزاد شما گرفته می شود که پس از اطمینان از سالم بودن محل عمل ، تغذیه شروع می گردد.
- 4- توجه شود که زمان تغذیه سرنوزادان بالاتر از سطح بدنش باشد.
- 5- شروع تغذیه در ابتدا با حجم کم و اندک و با فاصله باشد.
- 6- دارو های تجویز شده توسط پزشک تا کامل شدن دوره درمان به کودکان داده شود.
- 7- فرزندان تا سن 15 سالگی باید تحت نظر جراح اطفال باشد.