

مادرگرامی قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری فاویسم و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل می باشد.

سوالات رایج مادر :

بیماری فاویسم چیست ؟

این بیماری در اثر خوردن باقالی حتی باقالی خام و عبور از کشتزارهای باقالی و هم چنین برخی از داروها مانند آسپرین بروز می کند.

این افراد در خون خود دچار کمبود آنزیمی (آنزیم G6PD) هستند که در اثر تماس با باقالا یا مصرف آسپرین خون این افراد لیز و لخته می شود و دچار کم خونی می شود.

بیماری فاویسم ارثی است ولی مسری نیست و از فردی به فرد دیگر منتقل نمی شود فصل شیوع و بروز این بیماری در بهار می باشد زیرا در این فصل باقالا به فراوانی وارد بازار می شود و مخصوصاً در منطقه شمال و خوزستان شیوع بیشتری دارد

این بیماری ممکن است در هر سنی اتفاق بیفتد اما بیشترین سن ابتلا به بیماری ۲ تا ۶ سالگی است

علائم بیماری فاویسم چیست ؟؟

درد در ناحیه کمر ، استفراغ ، سرگیجه ، زردی بدن و چهره وادرار پررنگ است که در نهایت منجر به ضعف عمومی می شود.

زمانی نشانه های اولیه در فرد مبتلا به فاویسم بروز می کند حتماً وی را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل نمایید در موارد شدید بیماری درمان اولیه تزریق خون است . بیمار بهتر است مایعات شیرین مانند کمپوت و آبمیوه فراوان بنوشد. این بیماری در دوران نوزادی ممکن است به صورت زردی بروز کند که معمولاً ارتباطی با مصرف باقالی یا تماس با آن نداشته و درمان آن فتوتراپی خواهد بود .

خوشبختانه بیماری فاویسم قابل پیشگیری است

در صورتی که از کمبود آنزیم مربوطه در فرزندان خود آگاهی ندارید توصیه می گردد از مصرف باقالی و تماس با آن خودداری نمایید .

فردی که یک بیماری فاویسمی در خانواده اش وجود دارد باید سایر افراد را نیز مورد آزمایش اختصاصی قرار دهد تا از وجود یا عدم وجود بیماری اطلاع پیدا کند.

نام این آزمایش اندازه گیری همان آنزیم G6PD است.



در افراد مبتلا نکات زیر رعایت گردد:

- ❖ از کشتزار باقالی رد نشود و به باقالی و گل آن دست نزنند .
- ❖ اگر افرادی در خانواده مبتلا به این بیماری هستند باقالی در خانه پاک نشود.
- ❖ نفتالین در نزدیکی این بیماران نباشد

بسمه تعالی

کد سند: ۹۲-CC-PAM

شماره ویرایش: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۳



آموزش به بیمار

فاویسم یا بیماری باقلایی



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (بهار ۴۰۱)

مواردی که در اثر مصرف و تماس با آن سبب ظهور
فاویسم می گردد:

۱- باقالی به هر شکل

۲- برخی عفونت های ویروسی و باکتریایی

۳- دارو های ضد مالاریا مانند پریکمن ،
پاکتاسین ، کینوسید

۴- کوتریماکسیزول و ترکیبات مشابه
کلرامفنیکل و سولفاستامید

۵- مسکن و تب برها

۶- نالیدیکسیک اسید

۷- ویتامین کا و ث



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۵۴۵۴۵ داخلی ۲۴۵

ادامه نکاتی که در افراد فاویسم باید رعایت
گردد:

- ❖ رنگ های ساختمانی به طور کلی
ضرر دارند
- ❖ مادر شیرده از مصرف باقالی بپرهیزد
زیرا از راه شیر به فرزند منتقل
میشود
- ❖ در اتاق افراد فاویسمی نباید از
اسپری حشره کش استفاده کرد.
- ❖ در موارد الزامی پیش از مصرف
هرگونه دارو با پزشک مشورت شود.

