

- فرورفتگی قفسه سینه هنگام تنفس



تنفس سریع گذرا چگونه تشخیص داده می شود؟

- ۱- شمارش سلول های خونی و کشت خون برای رد عفونت
- ۲- عکس برداری از قفسه سینه
- ۳- تجزیه گاز های خون برای بررسی اکسیژن و دی اکسید کربن خون
- ۴- نظارت مداوم بر میزان اکسیژن ، تنفس ، ضربان قلب نوزاد

در بعضی نوزادان که این مایع به طور کامل جذب نمی شود باز نگه داشتن کیسه های هوایی ریه سخت است به همین خاطر کودک سریع نفس می کشد.

تاکی پنه در چه نوزادانی دیده می شود؟

۱-در نوزادان کمتر از ۳۸ هفته

۲-مادر مبتلا به دیابت یا آسم

۳-دو قلوها

۴- جنس پسر باشد.



تاکی پنه در نوزاد با چه علامتی دیده می شود؟

-رنگ کبود پوست

- تنفس سریع که با ناله همراه است

- پرش پره های بینی

مادرگرمی قدم نو رسیده مبارک :

این برگه آموزشی جهت آشنایی شما با بیماری تنفس سریع گذرا نوزادی و مراقبت از فرزند دلبندتان در منزل و پیشگیری می باشد.

تنفس سریع گذرا یا تاکی پنه گذرا نوزادی چیست :

نوعی اختلال است که کمی پس از تولد در نوزاد زودرس دیده می شود.

گذرا یعنی کوتاه مدت (کمتر از ۴۸ ساعت) و تاکی پنه به معنی تنفس سریع (نوزاد طبیعی ۶۰ تا در یک دقیقه تنفس دارد یعنی ۶۰ بار در یک دقیقه شکم نوزاد حرکت می کند تنفس سریع یعنی بیشتر از ۶۰ تا در دقیقه تنفس دارد)

تنفس سریع گذرا به چه علت بروز می کند؟

در طول رشد دوران جنینی ،ریه ها مایع خاصی به نام سورفاکتانت می سازند که به رشد ریه ها کمک میکند هنگامی که کودک ترم متولد شود هورمون هایی موقع زایمان تولید می شود که ساخت این ماده را متوقف می کند و با اولین نفس کشیدن نوزاد ریه پر از هوا می شود و این مایع جذب می شود



آموزش به بیمار

تنفس سریع گذرا نوزاد



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (تابستان ۴۰۱)

مراقبت از نوزاد در منزل و زمان مراجعه به پزشک

-درجه حرارت بدن نوزاد را ثابت نگه دارید و از سرد شدن بدن هنگام تعویض لباس و حمام جلوگیری شود.

-قبل از تماس با نوزاد دست ها را بشوید و در صورت داشتن سرماخوردگی هنگام شیردهی ماسک بزنید.

-اصول صحیح شیردهی رو که پرستار آموزش داده است در منزل رعایت کنید تا مشکل در تنفس نوزاد ایجاد نشود.

-از تماس افراد مبتلا به سرماخوردگی و بیماری عفونی خودداری کنید.

-در صورتی که نوزاد جهت بررسی علل تنفس سریع به مشاوره متخصص قلب یا اکو نیاز دارد پیگیری کنید.

-چند روز پس از ترخیص به متخصص نوزادان جهت پیگیری درمان نوزاد خود مراجعه نمایید.

-در صورت مشاهده افزایش تعداد تنفس به همراه توكشیدگی قفسه سینه و كبودی اندام ها به پزشک مراجعه نمایید.

منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۴۵۵ داخلی ۲۴۵

درمان تنفس سریع گذرا:

به کودک اکسیژن داده می شود تا سطح اکسیژن خون پایدار شود کودک شما در طی چند ساعت پس از تولد به بیشترین میزان اکسیژن نیاز دارد بیشتر نوزادان مبتلا به تنفس سریع در کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت بهبود می یابند اما برخی به مدت چند روز به حمایت نیاز دارند.

جهت جلوگیری از بدتر شدن وضعیت نوزادی که تنفس سریع دارد شیردهی انجام نمی شود و نوزاد مایعات و مواد مغذی را از طریق رگ دریافت می کند تا کودک شما بهبود یابد و تا زمانی که پزشک معالج مطمئن نباشد عفونتی در بدن نوزاد وجود ندارد آنتی بیوتیک در یافت می کند.

تنفس سریع اغلب در ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد از زایمان از بین میرود اما در نوزادان نارس که در معرض خطر تنفس سریع شدید تری قرار داشته اند نیاز به بستری در بخش مراقبت ویژه دارند تا بیشتر حمایت شوند.

