

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت
بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده
در آن سلامت خود را بازیابید.

آدنیت مزانتر (لنفادنوپاتی مزانتریک)

لنفادنیت مزانتریک یا آدنیت مزانتر بیماری است
که در آن غدد لنفاوی ملتهب می شوند. هنگامی
که این بیماری بر غدد لنفاوی غشایی که روده را به
دیواره شکم متصل می کند اثر می گذارد به این
عارضه آدنیت مزانتر گفته می شود. عفونت
ویروسی روده علت اصلی بروز آدنیت مزانتر است
که به آن لنفادنیت مزانتر نیز گفته می شود. این
بیماری به طور عمده کودکان و نوجوانان را درگیر
می کند.

این بیماری دردناک می تواند علائمی مشابه
آپاندیسیت داشته یا باعث بروز در همروی روده
شود که در آن بخشی از روده داخل قسمت دیگری
از آن لغزیده و در هم تنیده می شوند. بر خلاف
آپاندیسیت یا در همروی روده آدنیت مزانتر به
ندرت جدی بوده و معمولاً خود به خود بهبود می
یابد.

علت آدنیت مزانتر

شایع ترین علت بروز آدنیت مزانتر یک نوع عفونت
ویروسی مانند گاستروآنتریت است که اغلب به آن
آنفلوآنزای معده نیز گفته می شود. این عفونت باعث
ایجاد التهاب غدد لنفاوی قرار گرفته در بافت نازکی که
روده کودک شما را به قسمت دیواره شکم متصل می
کند، خواهد شد.

سایر علل بروز آدنیت مزانتر شامل: عفونت باکتریایی،
بیماری التهابی روده و لنفوم می شود.

علائم آدنیت مزانتر

علائم احتمالی ابتلا به آدنیت مزانتر شامل موارد زیر می
شود:

- تب
- حساس شدن شکم
- بزرگ شدن غدد لنفاوی مزانتر
- درد شکم، غالباً در سمت راست بدن البته
این درد می تواند گسترده تر باشد.
- با توجه به عامل بروز بیماری، علائم و نشانه های ابتلا
به آدنیت مزانتر شامل موارد زیر می شود:
- استفراغ
- حالت تهوع



تشخیص آدنیت مزانتر

برای تشخیص بیماری کودک، پزشک در مورد سابقه بیماری
کودک سوالاتی را مطرح کرده و به معاینه کودک خواهد
پرداخت. آزمایشات زیر می تواند به تشخیص این بیماری
کمک کند:


- آزمایش خون: انجام آزمایش خون می تواند به
تشخیص احتمال ابتلای کودک به عفونت و نوع
عفونت کمک کند.
- آزمایشات تصویر برداری: انجام سونوگرافی شکمی
از جمله مواردی است که اغلب برای تشخیص
آدنیت مزانتر مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین
پزشک ممکن است سی تی اسکن شکمی را برای
کودک تجویز کند.



مارستان خاتم الانبیاء تاسیاد
آموزش به بیمار

آدنیت مزانتر

(لنفادنوپاتی مزانتریک)



بیمارستان خاتم الانبیاء تاسیاد

واحد آموزش به بیمار (تاسستان ۴۰۱)

سبک زندگی و درمان های خانگی آدنیت

مزانتر

برای درد و تب ناشی از این بیماری بهتر است موارد زیر را برای کودک خود رعایت کنید:

- استراحت فراوان: استراحت کافی می تواند به بهبودی هرچه سریع تر کودک کمک کند.
- مایعات کافی: مایعات به جلوگیری از کم آب شدن بدن در اثر آب، استفراغ، و اسهال کمک خواهد کرد.
- کمپرس گرم: از یک دستمال مرطوب و گرم برای کاهش درد و ناراحتی های شکمی کودک کمک کرده و آن را روی شکم کودک قرار دهید.



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۴۵۲۵۴۵ داخلی ۲۴۵

درمان

موارد خفیف و بدون عارضه آدنیت مزانتر و مواردی که در اثر ویروس به وجود آمده باشند معمولاً خود به خود و بدون نیاز به هیچ درمانی بهبود خواهند یافت. البته بهبود این افراد ممکن است مدت زمان چهار هفته یا بیشتر به طول بیانجامد.

برای درمان تب یا درد در نوزادان و کودکان می توانید در صورت تجویز پزشک از داروهای بدون نیاز به نسخه ضد تب و داروهای ضد درد مانند استامینوفن یا ایبوپروفن به عنوان جایگزین مطمئن تری برای آسپرین استفاده کنید.

در هنگام دادن داروی آسپرین به کودکان یا نوجوانان نهایت احتیاط را به خرج دهید. اگرچه آسپرین برای استفاده در کودکان بزرگتر از ۳ سال تایید شده است اما کودکان و نوجوانانی که از بیماری آبله مرغان یا علائم شبه آنفولانزا بهبود می یابند هرگز نباید آسپرین مصرف کنند. این امر به این دلیل است که آسپرین در چنین کودکانی با ابتلا سندرم ریه که بیماری نادر و تهدید کننده زندگی است، مرتبط است.

همچنین برای عفونت باکتریایی متوسط تا شدید پزشک ممکن است آنتی بیوتیک تجویز کند.