

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

اوپيوم چیست :

شربت اوپيوم یکی از مشتقات ترياک است و ترکیبی بسیار اعتيادآور و خطرناک از ترياک، الکل و آب می باشد و متاسفانه میان مردم به عنوان یک داروی گیاهی شناخته شده است اما به دلیل بالا بودن غلظت مورفين در آن یک مخدر محسوب می شود .

دلایل مسمومیت کودکان با اوپيوم:

- بی دقتی والدین در نگهداری اوپيوم در دسترس کودکان
- بی دقتی تجویز کنندگان دارو در ظروف غیر استاندارد

علائم مسمومیت با اوپيوم:

۱. اختلال در هوشیاری
۲. تهوع و استفراغ
۳. اختلال تنفسی (به صورت تنفس های تند ، همراه با کبودی لبها ، زجر تنفسی، پرش پره های بینی و ...)
۴. نبض ضعیف
۵. تکانه های عضلانی

چگونه می توان از مسمومیت با اوپيوم جلوگیری کرد؟

- مواد سمی و داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید
- داروها و سایر سموم در برابر کودکان به صورت مقاوم بسته بندی نمایید.
- داروها و مواد سمی در منزل را در ظروف پلاستیکی با قفل کودک نگهداری نمایید.
- سطح آگاهی و دانش والدین و مراقبین کودک در رابطه با نحوه نگهداری داروها و مواد سمی افزایش یابد.

- جذابیت بسته های دارو و مواد سمی کاهش یابد.
- به کودکان بیاموزید هیچ چیزی را ننوشند و یا نخورند مگر اینکه با اجازه شما باشد.
- داروهای خود را در مقابل چشم کودکان نخورید ، چرا که کودکان از رفتار شما را تقلید می کنند و ممکن است دور از چشم شما داروها را به دهان ببرند.



بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- ۱۰۳

شماره ویرایش: -

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۳/۲۱



سازمان خاتم الانبیاء سلامت

آموزش به بیمار

مسمومیت با ماده مخدر

(اوپيوم)



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (بهار ۴۰۱)

تهیه و تنظیم: حمیده احسان پور

(رابط آموزش اطفال)

- گرفتن رگ ثابت از کودک و ارسال آزمایشات لازم
- شروع تزریق نالوکسان طبق نظر پزشک
- کودک تا زمان بهبود حال عمومی در بیمارستان بستری می ماند.



منبع:

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان، تلفن: 54523990 داخلی ۲۴۵

در صورت مصرف اوپیوم توسط کودکان چگونه رفتار کنید؟

- ضمن حفظ خونسردی، هر چه سریعتر درخواست کمک کنید (با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید)
- تا زمان رسیدن اورژانس کودکان را به پهلو ی چپ بخوابانید.
- باقیمانده ماده سمی یا قوطی را که نزدیک کودکان است را به بیمارستان ببرید یا به امدادگران اورژانس تحویل دهید.

پزشک و پرستار در صورت تشخیص مسمومیت با اوپیوم اقدامات زیر را برای کودک انجام می دهند:

- قرار دادن لوله معده
- شستشوی معده تا روشن شدن ترشحات معده (در صورتی که از زمان مصرف ماده کمتر از ۴ ساعت گذشته باشد)
- وارد کردن پودر شارکول یا سوربیتول به معده تا از جذب آن جلوگیری گردد.