

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

سپسیس

سپسیس (عفونت خون) زمانی اتفاق می افتد که میکروب در ریه، مجاری ادراری و مثانه یا خون، سمی تولید می کند که به سیستم ایمنی بدن حمله میکند. میتواند بسیار خطرناک باشد زیرا در صورتیکه درمان نشود بر روی کلیه ها، ریه ها مغز و گوش اثرات خطرناکی خواهد گذاشت و حتی ممکن است باعث معلولیت و یا حتی مرگ شود.

انواع سپسیس

سپسیس زودرس (اولیه):

در هفته اول زندگی نوزاد دیده میشود اغلب در ۲۴ ساعت اول زندگی تظاهر می یابد. عفونت اغلب از مادر به نوزاد منتقل میشود. ممکن است به وسیله باکتری یا عفونت حاصل از مادر در طول بارداری، زایمان زودرس، جدایی پرده ها (جفت) که بیش از ۲۴ ساعت طول بکشد، عفونت جفت و مایع آمنیوتیک در طول زایمان ایجاد شود.

سپسیس دیررس (ثانویه):

نوع دوم بعد از زایمان حاصل میشود. ممکن است به وسیله تجهیزات آلوده بیمارستان، در معرض قرار گرفتن داروهایی که منجر به مقاومت آنتی بیوتیک میشوند. داشتن یک کاتتر در یک رگ برای مدت طولانی، ماندن در بیمارستان به مدت طولانی و ... ایجاد میشود.

- علائم کم شیر خوردن یا عدم شیر خوردن
- تب ۳۸ درجه و بالاتر از آن در نوزادان تا یک ماه
- زجر تنفسی (تلاش تنفسی) یا تنفس غیر عادی
- تغییر رنگ پوست (رنگ پریده یا کبود یا زرد شدن پوست)
- خواب آلودگی و گیجی
- تغییر در تن عضلانی نوزاد یا کودک سفتی یا شلی خاص
- کاهش یا افزایش ضربان قلب نسبت به حد طبیعی
- گاه اسهال و استفراغ
- تغییر در تن صدای نوزاد و یا گریه های جیغ مانند و بیش از حد

• تشنج

- تورم و برجستگی ملاجها (فونتanelها) در نوزادان
- هرگونه تغییر رفتار یا حرکاتی که شما را نگران کند

همه علائم و نشانه ها به این معنی نیست که فرزند شما مبتلا به سپسیس است اما در شیر خواران زیر ۳ ماه باید فوراً کنترل شود تا مطمئن شویم که اشتهای رخ نداده است.




تست های آزمایشگاهی

آزمایش خون (شمارش گلبولهای سفید و قرمز خون) و کشت خون و آزمایش ادرار
ممکن است LP (آزمایش مایع مغزی نخاعی) انجام شود که بستگی به سن و علائم شیرخوار دارد.
عکس رادیوگرافی از قفسه سینه

درمان

شیرخوار مبتلا به سپسیس یا حتی موارد مشکوک به آن، در بیمارستان جهت درمان بستری میشوند و با دیدن علائم عفونت نهفته، پزشکان آنتی بیوتیک های تزریقی را برای مقابله با عفونت در نوزاد شروع میکنند. قطعاً پزشکان برای عفونت نوزادان، آنتی بیوتیک تراپی را حتی قبل از تشخیص قطعی شروع میکنند. اگر علائم ظاهر شود داروی تنظیم فشارخون و بهتر نگهداشتن عملکرد قلب، و داروهای تنفسی را برای کمک به تنفس موثر در نوزاد شروع میشود



هشدارها

وجود هرگونه عفونت در نوزادان یا شیرخواران ذر مقایسه با اطفال وبالغین بسیار خطرناک تر خواهد بود. در این گروهها سیستم ایمنی به خوبی شکل نگرفته است و هنوز توان مقابله با انواع عفونت ها را پیدا نکرده است به همین علت است که گفته میشود باید درمان عفونت نوزادان در بیمارستان صورت گیرد. شیرخواران زیر ۲ ماه بیشتر مستعد عفونت خون هستند زیرا سیستم ایمنی آنها هنوز بقدر کافی جهت دفع برخی از منابع عفونی، رشد نکرده است.

اگر درجه حرارت بدن شیرخوار ۳۸ درجه و علائمی شبیه خواب آلودگی، کم اشتها و مشکل تنفسی داشته باشد، بهتر است به پزشک مراجعه کنید.



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری
بیمارستان تلفن: ۰۲۳۹۹۰۵۴۵۵ داخلی ۲۴۵

بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC-۷۲

شماره ویرایش: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۶/۱۱



سازمان خاتم الانبیاء تأسیس

آموزش به بیمار

سپسیس



بیمارستان خاتم الانبیاء تأیید

واحد آموزش به بیمار (تابستان ۴۰۱)