

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت
بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده
در آن سلامت خود را بازیابید

توریشن بیضه (پیچ خوردگی بیضه)

توریشن بیضه یا همان پیچ خوردگی بیضه در
کودکان، پیچ خوردگی دردناک بیضه و طناب بیضه
در پسران است. طناب اسپرماتیک مجموعه ای از
اعصاب و مجاری و رگهای خونی است که از کشاله
ران به بیضه منتهی میشود. پیچ خوردگی بیضه در
کودکان می تواند در یک یا هر دو بیضه اتفاق بیفتد
. پیچ خوردگی بیضه باعث میشود خون به بیضه ها
نرسد و این امر میتواند به این عضو آسیب جدی
برساند. این مشکل در پسران کوچک و پسران
نوجوان زمانی اتفاق می افتد که بیضه ها کاملاً به
کیسه بیضه متصل نشوند. این حالت اجازه می
دهد بیضه ها آزادتر حرکت کنند و پیچ خوردگی
ممکن است در هنگام فعالیت بدنی و ورزشی نیز
اتفاق بیفتد. پیچ خوردگی بیضه در نوزاد هنگامی
اتفاق می افتد که کیسه اطراف بیضه به بیضه
متصل نشده باشد.

علائم پیچ خوردگی بیضه در کودکان

چیست؟

شدت علائم به این بستگی دارد که بیضه به طور
جزیی یا کاملاً پیچ خورده باشد. علائم می تواند
در هر کودک کمی متفاوت باشد. کیسه بیضه
ممکن است:

۱. دردناک ۲. متورم ۳. سفت (در نوزاد)
۴. کبودی (در نوزاد) ۵. نزدیکتر به کشاله ران
باشد ۶. کودک شما ممکن است حالت تهوع و
استفراغ نیز داشته باشد.



پیچ خوردگی بیضه در کودکان چگونه

تشخیص داده میشود؟

پزشک اطفال در مورد علائم و سابقه سلامتی
کودک شما سوال خواهد کرد. وی همچنین
ممکن است در مورد سابقه سلامتی خانواده شما
سوابقی را جستجو کند. پزشک اطفال کودک را
به صورت فیزیکی معاینه خواهد نمود. وی
همچنین ممکن است آزمایشاتی مثل سونوگرافی
انجام دهد.

پیچ خوردگی بیضه در کودکان چگونه

درمان میشود؟

پیچ خوردگی بیضه اغلب نیاز به درمان فوری
دارد و یک اورژانس پزشکی محسوب میشود.
هرچه پیچش شدیدتر باشد سریعتر به درمان
نیاز است. در بعضی موارد پیچ خوردگی ممکن
است با دست باز شود اما هنوز هم برای حفظ
بیضه در محل لازم است اقداماتی انجام شود تا
پیچ خوردگی دوباره رخ ندهد.

بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC- 81

شماره ویرایش: ۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۰۳/۲۵



بیمارستان خاتم الانبیاء تمشاد

آموزش به بیمار

توریشن تستیس در کودکان

(پیچ خوردگی بیضه ها)



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (خرداد ۱۴۰۱)

- از انجام ورزشهای سنگین مثل بلند کردن وزنه و یا رفتن به ارتفاعات اجتناب کند رژیم غذایی خاصی ندارد و میتواند از غذاهای معمولی استفاده نماید.
- از پوشاندن لباس های تنگ به کودک اجتناب کنید .

پیشگیری

اگر کودک شما علایم پیچ خوردگی بیضه داشته باشد این یک اورژانس است.

اگر در کودک علایم تب ، لرز ، درد عضلانی ، سردرد ، سرگیجه ، احساس ناخوشی عمومی و خونریزی بیش از حد پس از جراحی بروز نمود به پزشک معالجتان مراجعه نمایید .



<http://medlineplus.gov>

منبع:

کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری بیمارستان

تلفن: ۰۵۴۵۲۳۹۹۰ داخلی ۲۴۵

برای کاهش خطر مشکلات طولانی مدت باید طی ۶ ساعت پس از بروز علایم جراحی انجام شود . جراحی همچنین میتواند از بروز مجدد پیچش جلوگیری کند . اگر بیماری به سرعت درمان نشود میتواند منجر به از بین رفتن بیضه و ناباروری شود .

مراقبتهای پس از عمل

- پس از جراحی از کیسه یخ برای تسکین درد و تورم کودک استفاده کنید .
- یخ را در پلاستیک بگذارید آن را در طرف آسیب دیده بگذارید و با یک پارچه یخ را از پوست جدا کنید . هر بار ۵ تا ۱۰ دقیقه یخ را روی موضع قرار دهید . در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.
- بعد از جراحی کودک میتواند به تدریج فعالیت های طبیعی خود را از سر بگیرد .
- از بروز هر گونه ضربه به ناحیه جراحی پرهیز شود.