

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

انواع بیهوشی

در صورت جراحی، پزشک به شما دارویی بنام بیهوشی می دهد. بی حسی باعث کاهش یا جلوگیری از درد می شود. سه نوع اصلی وجود دارد:

- موضعی: یک ناحیه کوچک از بدن را بی حس می کند. شما بیدار و هوشیار هستید.
- منطقه ای: درد در ناحیه ای از بدن، مانند بازو یا پا را مسدود می کند. یک نوع شایع بی حسی اپیدورال است که اغلب در هنگام زایمان استفاده می شود.
- عمومی: شما را بیهوش می کند. شما هیچ دردی ندارید و بعد از آن روش را به خاطر نمی آورید. همچنین ممکن است یک آرام بخش برای آرامش شما تجویز شود. شما بیدار می شوید اما ممکن است پس از آن روش را به خاطر نیاورید. از آرام بخش می توان با بیهوشی یا بدون آن استفاده کرد.
- نوع بی حسی یا آرام بخش شما بستگی به عوامل بسیاری دارد. اینها شامل روشی هستند که شما انجام می دهید و سلامت فعلی شما را شامل می شود.



بیهوشی عمومی:

ترکیبی از داروهایی است که شما را در حالت خواب مانند قبل از جراحی یا سایر روشهای پزشکی قرار می دهد. تحت بیهوشی عمومی، احساس درد نمی کنید زیرا کاملاً بیهوش هستید. بیهوشی عمومی معمولاً از ترکیبی از داروهای داخل وریدی و گازهای استنشاقی (بیهوشی) استفاده می کند.

بیهوشی عمومی چیزی بیش از خوابیدن است، هرچند احتمالاً این راه را برای شما احساس خواهد کرد. اما مغز بیهوش به سیگنال های درد یا رفلکس پاسخ نمی دهد.

متخصص بیهوشی پزشک متخصص آموزش دیده و متخصص در بیهوشی است. در حالی که تحت بیهوشی هستید، متخصص بیهوشی عملکردهای حیاتی بدن شما را تحت نظر دارد و تنفس شما را کنترل می کند. آنچه انتظار دارید قبل از عمل:

قبل از انجام بیهوشی عمومی، متخصص بیهوشی با شما صحبت خواهد کرد و ممکن است در مورد این موارد سؤال کند:

- تاریخچه سلامتی شما
 - داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و مکمل های گیاهی
 - آلرژی
 - تجربیات گذشته خود را با بیهوشی انجام دهید
- این به متخصص بیهوشی شما کمک می کند داروهای را انتخاب کند که از نظر شما امن ترین باشد.

شخصی از تیم مراقبت های بیهوشی هنگام خواب شما را به طور مداوم کنترل می کند. او داروها، تنفس، دما، مایعات و فشار خون شما را در صورت لزوم تنظیم می کند. مواردی که در طول عمل جراحی اتفاق می افتد با داروهای اضافی، مایعات و گاهی اوقات انتقال خون اصلاح می شود.

متخصصان بیهوشی چه کاری انجام می دهند؟ متخصص بیهوشی پزشکی هستند که بیماران را در طول جراحی و در طی بهبودی با دقت کنترل می کنند. آنها از دستگاههای الکترونیکی بسیار پیشرفته ای استفاده می کنند که به طور مداوم فشار خون بیماران، میزان اکسیژن خون، عملکرد قلب و الگوهای تنفس را نشان می دهند. این دستگاه ها به طور چشمگیری ایمنی بیهوشی عمومی را به طور چشمگیر افزایش می دهد، متخصص بیهوشی برای بیدار شدن از خواب داروها را معکوس می کند. شما به آرامی در اتاق عمل یا اتاق بهبودی از خواب بیدار خواهید شد. احتمالاً هنگام اولین بیدار شدن احساس گرگی و کمی گیج خواهید کرد. ممکن است عوارض جانبی رایج مانند:

- حالت تهوع
- استفراغ
- دهان خشک

عوارض بیهوشی عمومی



بسمه تعالی

کد سند: ۵۵-PAM-CC

شماره ویرایش: ۲

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۲/۶/۱۶



بیمارستان خاتم الانبیاء تاساد

آموزش به بیمار

بیهوشی عمومی



بیمارستان خاتم الانبیاء تأیید

واحد آموزش به بیمار (تأیید ۴۰۱)

- ابتدا مایعات مصرف کنید و در صورت تحمل به آرامی یک وعده غذایی سبک (مانند سوپ و...) را شروع کنید.



- حداقل ۲۴ ساعت ماشین رانندگی نکنید.
- حداقل ۲۴ ساعت تجهیزات پیچیده کار نکنید
- هیچ تصمیم مهمی اتخاذ نکنید و هیچ اسناد قانونی را برای روز امضا نکنید.
- هیچ دارویی را مصرف نکنید، مگر اینکه پزشک خود تجویز کرده یا در مورد آنها صحبت کنید.
- حداقل ۲۴ ساعت الکل ننوشید.



<http://medlineplus.gov>

منبع:

کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری بیمارستان

تلفن: ۲۴۵۰۳۹۹۰-۵۴۵۱۵۴۵

عوارض بیهوشی عمومی:

- گلو درد
- دردهای عضلانی
- خارش
- لرزیدن
- خواب آلودگی

برقراری ارتباط و همکاری پس از عمل نیز ضروری است

داروهای بیهوشی که به شما داده شده است می توانند تا ۲۴ ساعت پس از تجویز در بدن شما باقی بمانند. شما تا زمانی که بیهوشی به طور کامل از بین نرفته است، کاملاً "به خود قدیمی خود بازنگشته اید".

همچنین در این مدت، هنوز هم ممکن است مواد وارد شده به بدن شما با بیهوشی تعامل داشته باشند. برخی از مواد ممکن است باعث واکنش منفی شوند. بنابراین، در مورد چه داروهای مصرفی می توانید با ارائه دهنده خدمات مراقب باشید. بعد از عمل با پزشک متخصص بیهوشی و پزشک خود همکاری کنید و می توانید در صورت نیاز از ایشان سؤال پرسید.

- به همراه یک فرد مسؤول (همراهی) از مراکز درمانی خارج شوید.

- روز را بی سر و صدا در خانه بمانید و استراحت کنید.
- ترتیب دهید تا شخصی در طول روز از فرزندان کوچک شما مراقبت کند.