




دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آموزش به بیمار

ختنه



دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد
واحد آموزش

منبع:

www.nursingconsult.com



با آرزوی سلامتی برای

شما و کودک عزیزتان

در صورت مشاهده موارد زیر باید با پزشک

خود تماس بگیرید:

✎ خونریزی مداوم

✎ افزایش قرمزی و یا عدم برطرف شدن آن ۳ تا ۵

روز پس از ختنه

✎ تب

✎ شدید ترشح و تورم، ترشح بدبو، تاول چرکی

✎ ناتوانی در ادرار کردن در ۸-۶ ساعت اول پس از

ختنه

✎ در صورتی که حلقه ختنه تا ۱۰-۱۲ روز پس از

عمل نیافتد کل آلت قرمز و متورم باشد

✎ عدم پاسخ به مسکن و بی قراری شدید، گریه

شدید و امتناع از غذا خوردن

این پمفلت شامل اطلاعاتی در مورد مراقبت و درمان از کودک شما است. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن شاهد بهبودی کودکتان باشیم.



© ختنه چیست؟ ختنه شایعترین عمل جراحی است که روی نوزادان پسر انجام می شود. در ختنه پوست کلاهک آلت برداشته می شود. ختنه عموماً به دو روش حلقه و جراحی انجام می پذیرد.



مراقبت قبل از عمل

از ساعت ۵ صبح روز عمل کودک باید ناشتا باشد.

قبل از جراحی کودک را حمام کنید.

مراقبت پس از انجام ختنه

در ۱۲ ساعت اول برای کاهش درد و بی قراری کودک از قطره استامینوفن به میزان ۲ برابر وزن کودک هر ۴ ساعت استفاده کنید (حتماً در مورد مصرف این دارو از پزشک اجازه بگیرید)

در ۱۲ ساعت اول از شستشوی محل ختنه پرهیز کنید و چنانچه کودک اجابت مزاج داشت با دستمال مرطوب یا پنبه محل آلوده را تمیز نمایید.

بعد از ۱۲ ساعت شستن و حمام کردن کودک مانعی ندارد.

بعد از ۱۲ ساعت شستن و حمام کردن کودک مانعی ندارد.

روزی ۳ بار به مدت ۲ روز محل ختنه را با پماد تجویز شده توسط پزشک آغشته کنید.

برای جلوگیری از فشار به محل ختنه، از پوشاندن شلوار و لباس تنگ به کودک تا زمان افتادن حلقه خودداری کنید و از پوشک با سایز بزرگتر استفاده کنید.

در صورتی که از داروی دل درد برای کودکتان استفاده می کنید در شب اول طبق نظر پزشک آن را مصرف کنید و در صورت لزوم تکرار کنید.

در همان ساعات اولیه تا ۳ مرتبه به کودک آب قند بدهید.

حدود ۲۴ ساعت پس از ختنه در قسمت بعد از حلقه تورم و التهاب ایجاد می گردد که در صورت تورم شدید و غیر طبیعی به پزشک مراجعه کنید.

حلقه تا روز دهم می افتد چنانچه با مشکلی مواجه شدید، مراجعه کنید.

یک هفته پس از ترخیص جهت بررسی مجدد و معاینه به پزشک مراجعه کنید.

در زمان جدا شدن حلقه ممکن است مختصری خونریزی اتفاق افتد که طبیعی است.

تا ماهها بعد از ختنه بهتر است از پوشک و شلوار گشادتر استفاده کنید و محل مجرای ادراری را با وازلین چرب کنید.

