


مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

کریپتورکیدیسم یا بیضه پنهان

بیضه نزول نکرده زمانی اتفاق می افتد که یک یا هر دو بیضه قبل از تولد نتوانند به داخل کیسه بیضه حرکت کنند.



علائم و نشانه‌ها:

- دیده نشدن یا احساس نشدن بیضه ها درون کیسه بیضه نشانه اصلی این بیماری است.

• ناباروری

• خطر سرطان و عواقب روانشناختی


علل:

بیشتر اوقات بیضه های یک پسر تا ۹ ماهگی پایین می آید. بیضه های نزول نکرده در نوزادانی که زود به دنیا می آیند شایع است. این مشکل در نوزادان ترم کمتر رخ می دهد.

برخی از نوزادان وضعیتی به نام بیضه های جمع شونده دارند و ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ممکن است نتواند بیضه ها را پیدا کند. در این حالت، بیضه طبیعی است، اما توسط یک رفلکس عضلانی از کیسه بیضه بیرون کشیده می شود. این به این دلیل است که بیضه ها قبل از بلوغ هنوز کوچک هستند. بیضه ها در دوران بلوغ به طور طبیعی پایین می آیند و نیازی به جراحی نیست.

بیضه هایی که به طور طبیعی به داخل کیسه بیضه نزول نمی کنند، غیر طبیعی در نظر گرفته می شوند. بیضه نزول نکرده بیشتر احتمال دارد به سرطان مبتلا شود، حتی اگر با جراحی به کیسه بیضه وارد شود. احتمال ابتلا به سرطان در بیضه دیگر نیز بیشتر است.

بیضه نزول نکرده (همچنین به عنوان کریپتورکیدیسم شناخته می شود) وضعیتی است که در آن یک یا هر دو بیضه نوزاد پسر (بیضه) به سمت پایین و در محل مناسب خود در کیسه بیضه حرکت نکرده است.





آموزش به بیمار

کریپتورکیدیسیم یا بیضه پنهان



بیمارستان خاتم الانبیاء قایباد

واحد آموزشی به بیمار (بهار ۱۴۰۱)

درمان به چند دلیل ضروری است:

بالا بودن در بدن به این معنی است که دمای بیضه نزول نکرده بالاتر از حد معمول است (بیضه ها برای تولید اسپرم باید کمتر از دمای معمولی بدن باشند). دمای بالاتر ممکن است به رشد بیضه و توانایی آن در تولید اسپرم در آینده آسیب برساند. این ممکن است منجر به ناباروری (ناتوانی در داشتن فرزند) شود.

همه پسر ها حتی آنهایی که بیضه هایشان به درستی پایین آمده است باید یاد بگیرند که چگونه در نوجوانی خودآزمایی بیضه انجام دهند تا بتوانند هر گونه توده یا برآمدگی را که ممکن است نشانه اولیه مشکلات پزشکی باشد، را بدانند.



منبع:

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان، تلفن: 54523990 داخلی ۲۴۵

تشخیص:

پزشکان معمولاً کریپتورکیدیسیم را در طول معاینه فیزیکی در بدو تولد یا در معاینه کمی پس از آن تشخیص می دهند. اکثر بیضه های نزول نکرده را می توان در معاینه پزشک پیدا کرد یا "لمس" کرد.

در چند پسر، ممکن است بیضه در جایی نباشد که بتوان آن را لمس کرد و ممکن است به نظر گم شده باشد. در برخی از این موارد، بیضه می تواند داخل شکم باشد



درمان:

اگر تا ۶ ماهگی نوزاد بیضه خود به خود پایین نیامده است، باید توسط متخصص اطفال معاینه شود و در صورت تایید بیماری تحت درمان قرار گیرد. این معمولاً شامل جابجایی بیضه در کیسه بیضه با جراحی است.