


مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

هیپوسپادیاس

نوع بیماری:


هیپوسپادیاس یک نقص مادرزادی است که در آن دهانه مجرای ادرار در قسمت زیرین آلت تناسلی قرار دارد. مجرای ادرار لوله ای است که ادرار را از مثانه تخلیه می کند. در مردان، دهانه مجرای ادرار معمولاً در انتهای آلت تناسلی است.



علل:

هیپوسپادیاس در ۴ نفر از هر ۱۰۰۰ نوزاد پسر اتفاق می افتد. علت اغلب ناشناخته است. گاهی اوقات، این بیماری از طریق خانواده ها منتقل می شود.

ترمیم هیپوسپادیاس یک عمل جراحی برای اصلاح نقص در دهانه آلت تناسلی است که در بدو تولد وجود دارد. مجرای ادرار (لوله ای که ادرار را از مثانه به خارج از بدن می برد) به نوک آلت تناسلی ختم نمی شود. در عوض، در قسمت زیرین آلت تناسلی به پایان می رسد. در موارد شدیدتر، مجرای ادرار در وسط یا پایین آلت تناسلی یا در داخل یا پشت کیسه بیضه باز می شود.



درمان:

در اکثر موارد جراحی می شوند. بیشتر بچه هایی که در حین جراحی استفاده می شوند خود به خود حل می شوند و بعداً نیازی به برداشتن آن ها نیست.

ترمیم هیپوسپادیاس یک عمل جراحی برای اصلاح نقص در دهانه آلت تناسلی است که در بدو تولد وجود دارد. مجرای ادرار (لوله ای که ادرار را از مثانه به خارج از بدن می برد) به نوک آلت تناسلی ختم نمی شود. در عوض، در قسمت زیرین آلت تناسلی به پایان می رسد. در موارد شدیدتر، مجرای ادرار در وسط یا پایین آلت تناسلی یا در داخل یا پشت کیسه بیضه باز می شود.

مراقبت ها:

قبل از جراحی بیمار ناشتا باشد، کودک شما بیهوشی عمومی دریافت می کند. این باعث می شود که او بخوابد و نتواند در حین جراحی احساس درد کند



آموزش به بیمار

هیپوسپادیاس


درمان هیپوسپادیاس در نوزادان چگونه است؟



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (بهار ۱۴۰۱)

پسرانی که با هیپوسپادیاس متولد می شوند نباید در بدو تولد ختنه شوند. بافت اضافی پوست ختنه گاه ممکن است برای ترمیم هیپوسپادیاس در حین جراحی مورد نیاز باشد.



منبع:

<http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان، تلفن: 54523990 جراحی ۲۳۹

عیوب خفیف ممکن است در یک روش ترمیم شوند نقص های شدید ممکن است به دو یا چند روش نیاز داشته باشد لازم است که تعویض پانسمان پس از عمل انجام شود

فعالیت و توصیه ها:

از فعالیت سنگین تا مدتی اجتناب شود. جراح از یک قطعه کوچک از پوست ختنه گاه یا بافت از محل دیگری برای ایجاد لوله ای استفاده می کند که طول مجرای ادرار را افزایش می دهد. افزایش طول مجرای ادرار به آن اجازه می دهد تا در نوک آلت تناسلی باز شود

ترمیم هیپوسپادیاس اغلب در پسران بین ۶ ماه تا ۲ سال انجام می شود. جراحی به صورت سرپایی انجام می شود. کودک به ندرت مجبور است یک شب را در بیمارستان بگذراند.