

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

دسترسی عروقی

دسترسی عروقی شکافی است که در طی یک عمل کوتاه در پوست و رگ های خونی ایجاد می شود. وقتی دیالیز می شوید ، خون شما از مجرای دستگاه همودیالیز خارج می شود. بعد از اینکه خون شما در دستگاه فیلتر شد ، از طریق دسترسی به بدن شما دوباره جریان می یابد.



سه نوع دسترسی اصلی عروقی برای همودیالیز وجود دارد. شرح این موارد به شرح زیر است:

فیستول:

شریانی در بازو یا قسمت فوقانی بازو به رگ مجاور دوخته می شود.

این اجازه می دهد تا سوزن برای درمان دیالیز به داخل رگ وارد شود.

قبل از آماده شدن برای استفاده از فیستول ، از ۴ تا ۶ هفته طول می کشد تا بهبود یابد و بالغ شود.

پیوند:

یک سرخرگ و یک ورید در بازوی شما با یک لوله پلاستیکی U شکل در زیر پوست به هم متصل می شود.

هنگام انجام دیالیز ، سوزن ها در پیوند قرار داده می شوند.

پیوند می تواند در عرض ۲ تا ۴ هفته آماده استفاده شود.

کاتتر وریدی مرکزی:

یک لوله پلاستیکی نرم (کاتتر) زیر پوست شما تونل می شود و به صورت وریدی در گردن ، قفسه سینه یا کشاله ران قرار می گیرد. از آنجا ، لوله به یک رگ مرکزی می رود که به قلب شما منتهی می شود.

کاتتر وریدی مرکزی بلافاصله آماده استفاده است.

معمولاً فقط برای چند هفته یا چند ماه استفاده می شود





بیمارستان خاتم الانبیاء تاسیسات

آموزش به بیمار

دسترس عروقی



بیمارستان خاتم الانبیاء تاسیسات

واحد آموزش به بیمار (پاییز ۱۴۰۰)

مشکلاتی که باید مراقب آنها باشید

گرفت و کاتتر بیشتر از فیستول آلوده می شوند. علائم عفونت قرمزی ، تورم ، درد ، گرما ، چرک در اطراف محل و تب است.

لخته های خون ممکن است تشکیل شده و جریان خون را از طریق محل دسترسی مسدود کنند. پیوندها و کاتترها بیشتر از فیستول لخته می شوند.

رگ های خونی در پیوند یا فیستول شما می توانند باریک شده و جریان خون را از طریق دسترسی کند کنند. به این حالت تنگی گفته می شود



منبع: <http://medlineplus.gov>

آدرس کلینیک سلامت: طبقه پایین ساختمان اداری بیمارستان

تلفن: ۲۴۵۵۴۵۲۳۹۹۰ داخلی ۲۴۵

هنگامی که شما برای اولین بار بیمارستان را ترک می کنید ممکن است طی روزهای اول کمی قرمزی یا تورم در اطراف ناحیه دسترسی خود داشته باشید. اگر فیستول یا پیوند دارید:

بازوی خود را روی بالش قرار دهید و آرنج خود را صاف نگه دارید تا تورم کاهش یابد.

بعد از اینکه از جراحی به خانه برگشتید می توانید از بازوی خود استفاده کنید. اما ، بیش از ۱۰ پوند یا ۴,۵ کیلوگرم (کیلوگرم) ، که تقریباً به اندازه یک گالن شیر است ، بلند نکنید.

مراقبت از پانسمان (باند):

اگر پیوند یا فیستول دارید ، پانسمان را در ۲ روز اول خشک نگه دارید. بعد از جدا شدن پانسمان می توانید به طور معمول استحمام کنید یا دوش بگیرید.

اگر کاتتر وریدی مرکزی دارید ، باید همیشه پانسمان را خشک نگه دارید. هنگام دوش گرفتن آن را با پلاستیک بپوشانید. حمام نکنید ، شنا نکنید ، یا در وان آب گرم غوطه ور نشوید. اجازه ندهید کسی از کاتتر شما خون بگیرد