

مددجوی گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات شما جهت بیماریتان می باشد. امیدواریم با رعایت نکات ذکر شده در آن سلامت خود را بازیابید.

کورتاژ:

کورتاژ یعنی تراشیدن و خارج کردن قسمتی از بافت بدن و به معنی اتساع و بیرون آوردن جنین و بافت داخل رحم که به وسیله ساکشن و وسیله جراحی به نام کورت انجام میشود، میباشد.

کورتاژ دو نوع میباشد درمانی و تشخیصی

کورتاژ بعد از سقط جنین:

مهمترین علایمی که هنگام سقط دیده میشود، خونریزی از رحم و درد است. در شروع سقط، خونریزی اغلب اوقات به صورت لکه بینی آغاز میشود و طولی نمیکشد که زیادتر میشود و لخته های بزرگ تشکیل میشود. علت خونریزی باقی ماندن تکه ای از جفت و یا قسمتی از جنین در داخل رحم است و تا زمانی که این تکه ها خارج نشده اند، رحم جمع نمیشود و خونریزی ادامه دارد.

درد در ناحیه زیر شکم:

در موقع سقط جنین اکثر خانم ها از دردهای خفیف زیر شکم شکایت میکنند و این دردها اغلب متفاوت است علت این دردها انقباض عضله رحم برای خارج ساختن و یا لخته داخل آن است و تا زمانی که رحم خالی نشده است، درد نیز ادامه دارد.

چه عواملی باعث سقط جنین میشوند؟

بسیاری از سقطها دلیل مشخصی ندارند ولی بنا به نظر و عقیده بسیاری از پزشکان:

۱. جنینی که از نطفه های ضعیف و ناتوان پدر و یا مادر بوجود می آید، دیر یا زود از بین میرود و سقط میشود

۲. محیط نامناسب برای رشد و نمو نطفه مثل عفونتهای قبلی رحمی و تخمدانها، پولیپ و یا فیبروم رحمی، غده های رحمی، نقایص و ناهنجاریهای دستگاه تناسلی و تولید مثل مانند دوشاخ بودن رحم، گشاد بودن و کوتاه بودن دهانه رحم

۳. انجام عمل های جراحی های متعدد روی رحم و یا دهانه آن مثل کورتاژهای متعدد

۴. عفونتهای مزمن مثل سل، سیفلیس، کم خونی، اختلاف گروه خونی بین پدر و مادر

۵. اختلال در هورمونهای بدن

۶. عواملی مثل عصبانیت، شوکهای روحی شدید، کارهای سنگین و نزدیکی های جنسی زیاد در حاملگیهای پر خطر

کورتاژ تشخیصی چیست؟

خونریزیهای داخل رحمی که بر اثر داشتن پولیپ در دوران یائسگی رخ میدهد.

کورتاژ تشخیصی، خارج کردن محتویات رحم با بقایای محتویات است و با هدف بررسی نمونه بدست آمده و تشخیص ضایعه در رحم انجام میشود. در این مورد خونریزی بعد از عادت ماهیانه همچنان ادامه دارد و یا بصورت لکه بینی و یا خونریزی زیاد مشاهده میشود که بعد از انجام سونوگرافی، تشخیص توسط پزشک داده میشود و کورتاژ انجام میگردد و سپس نمونه از مواد داخل رحمی جهت تشخیص علت خونریزها به پاتولوژی ارسال میشود.



بیمارستان خاتم الانبیاء تمارا

آموزش به بیمار

آموزش

کورتاژ (کورتاژ تشخیصی و

درمانی)



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (پاییز ۴۰۱)

مراقبتهای پس از کورتاژ:

بعضی از خانم ها پس از چند ساعت فعالیتهای طبیعی خود را از سر میگیرند و بعضیها به چند روز استراحت نیاز دارند.

دردهای شکمی شایع هستند اما اصولاً بیشتر از ۲۴ ساعت طول نمیکشد. معمولاً چند روز تا ۲ هفته خونریزی خفیف وجود دارد. توصیه میشود خانم ها تا ۲ هفته و یا تا زمانیکه خونریزی متوقف شود، نزدیکی نداشته باشند. معمولاً ۴ تا ۶ هفته بعد پریود شروع میشود. مشخص نیست که تخمک گذاری چه زمانی به وضعیت نرمال برمیگردد بنابراین در اولین نزدیکی از قرص و یا سایر روشهای جلوگیری از بارداری استفاده شود.



منبع: <http://medlineplus.gov>

کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری

بیمارستان، تلفن ۵۴۵۲۳۹۹۰ داخلی ۲۴۵

کورتاژ چگونه انجام میشود؟

به دو روش بیهوشی عمومی و یا اسپاینال (بی حسی) انجام میشود. که در دروش اسپاینال تزریق ماده بی حسی در مایع مغزی نخاعی از طریق کمر انجام میشود و ناحیه عمل بی حس و بی حرکت میشود.

عمل به صورت بسته و از طریق واژن انجام میشود و معمولاً پزشک دهانه رحم را با وسیله ای باز نگه میدارد و به وسیله ساکشن و یا جسمی بنام کورت محتویات داخل رحم را بیرون میآورد و به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال میکند

