

مددجو گرامی:

این پمفلت در راستای افزایش اطلاعات
شما جهت سالپنژکتومی و یا برداشتن لوله های
رحم می باشد.

سالپنژکتومی: (برداشتن یک طرفه یا دو طرفه لوله رحم)

به عمل جراحی برداشتن لوله های رحم در یک
طرف (یک طرفه) و یا برداشتن لوله های رحم
در هر دو طرف (دو طرفه) گفته میشود. کاربرد
لوله های رحم (فالوپ)، اجازه دادن به تخمکها
برای عبور از تخمدانها به سمت رحم میباشد.

علت:

هر عاملی که باعث ایجاد مشکل در لوله های
رحم شود و یا باعث صدمه به آن شود مانند
حاملگی خارج رحم، عفونتهای شدید لگن،
چرخش لوله های رحم به دور خود و
چسبندگی و پارگی لوله های رحم و ... که با
تشخیص پزشک زنان ممکن است لوله برداشته
شود.

اقدامات قبل از عمل جراحی:


۱. انجام آزمایش خون

۲. گرفتن نوار قلب در بیماران بالای ۴۰ سال

۳. رادیوگرافی قفسه سینه در افراد بالای ۴۰ سال
که در ۳ ماه گذشته انجام نداده اند

۴. اگر دارویی مصرف میکنید حتما نام دارو را به
پزشک خود بگویید.

۵. به مدت ۱۲ ساعت ناشتا باشید و شب قبل از
عمل استحمام کنید.




مراقبتهای بعد از عمل:

۱. در صورت بروز علائم خطر مثل خونریزی، درد
شدید شکم و یا وجو تب و لرز و ... سریعا به پرستار
خود بگویید.

۲. در صورت شروع رژیم غذایی ابتدا مایعات (چایی
کم رنگ و یا آبمیوه (در صورت عدم بیماری
دیابت) و .. مصرف نمایید سپس کمی لبه ی تخت
بنشینید و در صورت عدم سرگیجه به کمک همراه
و واکر در بخش راه بروید و به دستشویی
بروید. مرتبا راه بروید چون راه رفتن از نفخ کردن
و یبوست جلوگیری میکند.

۳. از خوردن غذاهای نفاخ مثل حبوبات، شیر و ..
پرهیز نمایید.



بسمه تعالی

کد سند: PAM-CC-۷۷

شماره ویرایش: ۱

تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸



آموزش به بیمار

سالپنژکتومی

(برداشتن یک طرفه یا دو طرفه لوله رحم)



بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد

واحد آموزش به بیمار (اسفند ۴۰۰)

۶. در صورت بروز علام خطرری چون تنگی نفس، تب و لرز، خونریزی شدید، ترشح چرکی از محل زخم، تهوع و استفراغ، سوزش ادرار، درد پهلوی، سرگیجه، رنگ پریدگی و یا هر علامت خطر دیگری سریعاً به پزشک خود و یا درمانگاه مراجعه نمایید.



منبع: <http://medlineplus.gov>

کلینیک سلامت: قسمت پایین ساختمان اداری بیمارستان

تلفن: ۰۲۴۵۴۵۲۳۹۹۰ داخلی ۲۴۵

توصیه های بعد از ترخیص:

۱. از انجام کارهای سنگین و بلند کردن اجسام سنگین و زور زدن تا یک ماه پرهیز نمایید.
۲. از داشتن رابطه جنسی تا یک ماه پرهیز نمایید.

۳. روز سوم و یا چهارم بعد از عمل ایستاده حمام کنید روی بخیه ها را لیف نکشید و با آب و صابون و یا شامپو بچه شستشو دهید و سپس خشک نمایید و در صورت وجود با باد گرم سشوآر خشک نمایید.

۴. یک هفته تا ده روز بعد از عمل جهت کشیدن بخیه ها به پزشکتان و یا درمانگاه مراجعه نمایید.

۵. دو هفته الی یک ماه بعد جهت دریافت جواب نمونه پاتولوژی (نمونه برداری از محل عمل) به بخش پاتولوژی بیمارستان مراجعه نمایید.